

# РЕКОМЕНДАЦИИ ПО КОРМЛЕНИЮ БРОЙЛЕРОВ

Среднее выращивание птицы - 45 дней



**ЮЖНАЯ КОРОНА**

Брюховецкий комбикормовый завод

Наименование корма	Количество голов								
	1	10	20	30	40	50	60	100	150
Бр-1 СТАРТ	0,6 кг	6 кг	12 кг	18 кг	24 кг	30 кг	36 кг	60 кг	90 кг
Бр-2 РОСТ	1,5 кг	15 кг	30 кг	45 кг	60 кг	75 кг	90 кг	150 кг	225 кг
Бр-3 ФИНИШ	3,3 кг	33 кг	66 кг	99 кг	132 кг	165 кг	198 кг	330 кг	495 кг

Потребность питьевой воды	Температурное содержание	
Особое внимание обратить на постоянное наличие чистой воды в поилках и свободный доступ цыплят к ним	с 1 по 3 день	32-33 градусов
Поилка должна быть хорошо освещена, т.к. к плохо освещенной поилке цыплята не подходят	с 4 по 7 день	28-31 градусов
Отсутствие воды в течении 12 часов значительно влияет на рост цыплят	с 8 по 20 день	26-27 градусов
Обратите внимание на качество воды, используемой для поения цыплят	с 21 по 27 день	23-25 градусов
	с 28 по 45 день	20-22 градуса

Необходим постоянный контроль за вентиляцией и влажностью помещения.