

## РЕКОМЕНДАЦИИ ПО КОРМЛЕНИЮ НЕСУШКИ

Наименование корма	Возраст несушек	Расход комбикорма в среднем на одну голову в день	За весь период на одну голову
Пк-2 СТАРТ (гранула 2,0 мм)	0 - 7 недель	10 - 50 гр	1,7 кг
Пк-3 РОСТ (гранула 2,5 мм)	8 - 20 недель	50 - 100 гр	6,8 кг
Пк-1 НЕСУШКА (гранула 3,2 мм)	21 неделя и старше	100 - 120 гр	-

- Используйте комбикорм в сухом виде.
- Установите рядом с комбикормом поилку с чистой водой.
- Соблюдайте гигиену кормления: мойте кормушки и поилки горячей водой, проводите регулярную дезинфекцию в птичнике.

Возраст	t C° /	в помещении	под брудером
0 - 3 день		30 - 33 °C	35 °C
4 - 14 день		26 - 28 °C	30 - 35 °C
2 - 3 недели		22 - 26 °C	26 - 30 °C
4 - 6 недель		19 - 22 °C	-
7 недель и старше		17 - 19 °C	-

Только при выдерживании температурного режима можно сохранить хорошее состояние птицы и её производительность. Допустимая температура для разведения несушек — +5...+28 °C, оптимальная — +10...+25 °C. Для её регулирования в курятнике устанавливают термометр.